

2026.7.27.

올해부터 국가예방접종 지원 확대

우리 아이 여름방학엔 잊지 말고 HPV 백신 접종!



사람유두종바이러스(HPV) 예방접종 우리 아이에게 왜 필요할까요?

HPV는 매우 흔한 바이러스로, 감염 시 질병을 유발할 수 있습니다.
대부분 무증상으로 자연 소멸되지만
지속되면 암으로 이어질 수 있어 예방접종이 필요합니다.



HPV 관련 질환 발생률 감소 효과

- ✓ HPV 바이러스로 발생하는 생식기 사마귀 발생 감소
(남 71%, 여 58% 감소)
- ✓ HPV 16형, 18형 관련 암 발생 감소
(남 86%, 여 90% 감소)

2026.7.27.

올해 5월부터 2014년생 남성 청소년까지 전면 확대*된 HPV 국가예방접종!

* 기존 여성 청소년('08~'14년생)과 저소득층 여성('99~'07년생)에게만 지원



가까운 위탁의료기관

방문

2026.7.27.

예방접종만으로 높은 예방효과를 얻을 수 있어요

사람유두종바이러스(HPV) 감염으로 발생하는
자궁경부암 90% 이상, 생식기 사마귀의 89% 이상,
항문 상피 내 종양의 78% 이상 **예방효과**

* 자궁경부암 90%, 항문생식기암·구인두암 70%가 HPV 감염으로 인해 발생(미국 CDC)

암 및 관련 질환을 예방할 수 있는 효과적인 수단!



어린 연령대에 접종 시 HPV 감염증 예방 백신의 최대 효과를 기대할 수 있습니다!

첫 접종시기에 따라 필요한 총 접종 횟수가 달라집니다

첫 접종 시기	백신	필요 접종 횟수	접종 간격
14세 이전 첫 접종 시 (15세가 되는 생일 전날까지)	HPV 4가	2회	2차: 첫 접종 6개월 후
15세 이후 첫 접종 시 (15세가 되는 생일 이후부터)		3회	2차: 첫 접종 2개월 후 3차: 첫 접종 6개월 후

14세 이전 첫 접종 시

1차 --- 6개월 간격 --- 2차

총 2회 접종

15세 이후 첫 접종 시

1차 --- 2개월 간격 --- 2차 --- 4개월 간격 --- 3차

총 3회 접종

* 접종은 권장 횟수에 맞춰 끝까지 완료하는 것이 중요하며,
 접종 간격이 권장 일정보다 늦어졌더라도 남아 있는 횟수만 접종하면 됩니다.

예방접종 전·후에는 주의가 필요합니다!



안전한 예방접종을 위해
미성년자는 보호자와 동행하는 것이 원칙



예방접종 전 **예진표를 작성**하고
의사의 예진을 받아야 함



감기 등 가벼운 질환은 접종 시행 가능하며,
중증도 이상의 **심한 급성질환이 있는 경우**
접종 연기



예방접종 후 20-30분간 접종기관에 머물며
이상반응 관찰 후 귀가

※ 예방접종 후 드물게 어지러움 또는 일시적인 의식소실이
발생할 수 있으므로, 접종직후 갑자기 일어나지 말고
반드시 앉거나 누운 자세로 충분히 휴식하며 경과 관찰



접종 부위는 **청결하게 유지** 및
접종 당일 **무리한 신체활동 자제**



접종 후 2~3일간 주의 깊게 관찰하고
평소와 다른 신체 증상이 나타날 경우
반드시 의사에게 진료받기

2026.7.27.

우리 아이 HPV 무료 접종 놓치지 말고 꼭 챙겨 주세요!

질병관리청 예방접종도우미 누리집
(<https://nip.kdca.go.kr>)에서
의료기관 정보와 예방접종 이력을 확인해 보세요!

